

为 11.43% , 明显低于对照组的 37.50% , 差异有统计学意义 ($\chi^2=10.73$, $P < 0.05$)。

表 5 2 组不良反应情况比较 例

组别	n	恶心	呕吐	面部潮红	不良反应发生率(%)
治疗组	35	2	1	1	11.43
对照组	32	7	3	2	37.50

与对照组比较, ① $P < 0.05$

5 讨论

支气管炎是指气管、支气管黏膜及其周围组织的慢性非特异性炎症, 其多由病毒和细菌的反复感染形成支气管的慢性非特异性炎症而产生。一般情况下, 气温下降、呼吸道小血管痉挛、烟雾粉尘等刺激均可导致本病的发生, 若该病的病程在 4 周~2 月, 临床则称之为迁延性细菌性支气管炎, 患儿长期存在呼吸道症状, 非常容易因某些诱因而急性发作加重病情, 有些转变为支气管肺炎, 部分患儿最终发展为慢性支气管炎。考虑到该病病程迁延的原因是全身性、综合性的, 而临床常规西药治疗的效果往往不甚理想, 已经不能满足该病临床治疗的需要。

本病归属于中医学积滞的范畴, 小儿脏腑娇嫩, 脾胃功能弱, 经常因为乳食不节或者家长喂养不当而引发疾病^[9]。患儿消化不良不仅直接影响到营养物质的吸收, 还可导致肠道细菌、病毒大量繁殖, 从而造成胃肠道局部炎症的发生, 严重者

甚至可引发菌血症、病毒血症或者加重其他脏器的炎症等。因而, 如何加强迁延性支气管炎的治疗, 关键在于采取何种措施可有效改善患儿的消化功能, 更快速彻底地治愈疾病。小儿消积止咳口服液是由多种中药制成的镇咳类处方药, 主要成分包括山楂、槟榔、枳实、枇杷叶、瓜蒌、莱菔子、葶苈子、桔梗、连翘、蝉蜕等, 具有清热肃肺、消积止咳的功效。临床多用于小儿食积咳嗽与痰热温肺所致的咳嗽、夜间加重、喉间痰鸣, 腹胀, 口臭等疾病的治疗中。并且, 该药为中成药, 服用方便, 易被患儿接受, 与注射用阿莫西林克拉维酸钾配合治疗, 标本兼治, 疗效更佳。本研究结果提示, 小儿消积止咳口服液应用于儿童迁延性细菌性支气管炎的辅助治疗中, 不但临床治疗效果显著, 而且安全性高, 值得在临床上推广使用。

[参考文献]

- [1] 王中玉, 张丽. 头孢克肟联合小儿消积止咳口服液治疗儿童迁延性支气管炎 60 例疗效观察[J]. 山东医药, 2010, 50(29): 121-126.
- [2] 陈永红. 儿科疾病诊断与疗效标准[M]. 上海: 上海中医药大学出版社, 2006: 52-53.
- [3] 刘明. 小儿消积止咳口服液联合金叶败毒颗粒治疗急性支气管炎临床疗效研究[J]. 亚太传统医药, 2011, 7(10): 128-129.

(责任编辑: 吴凌)

《新中医》杂志稿约 (2016 年)

《新中医》是由国家中医药管理局主管、广州中医药大学与中华中医药学会共同主办的国家级学术期刊, 1969 年创刊。标准刊号: ISSN 0256-7415, CN 44-1231/R, 月刊, 期刊代号: 国内: 46-38, 国外: M186。根据国家的有关标准和科技期刊的编排规范, 对来稿做出如下要求: 一、征稿内容: 本刊设有思路研究论著、名医研究论著、临床研究论著、针灸研究论著、实验研究论著、文献研究论著、养生研究论著、护理研究论著、医案感悟杂谈等专栏。二、来稿要求: 主题鲜明, 论点明确, 论据充分, 文字精炼, 内容真实, 资料可靠, 数据准确, 数据比较应做统计学处理。三、来稿格式: 遵守中医药杂志的标准和本刊的规定。四、投稿方式: 用电子邮件将稿件发往本编辑部投稿邮箱: 139002863@qq.com。五、文责自负: 作者如有侵权行为, 本刊不负连带责任。署名人的顺序由作者决定。依照《著作权法》, 本刊对文稿有修改权、删节权, 修改稿未按时寄回视作自动撤稿。六、稿件采用: 需与编辑部签订论文著作权转让书, 并及时寄回《新中医》编辑部档案室。编辑部地址: 广州市番禺区广州大学城外环东路 232 号广州中医药大学办公楼《新中医》编辑部。邮编: 510006。电话: 020-39359588。